

**AREA PRONTO SOCCORSO (comprende PS, PS Pediatrico, Radiodiagnostica PS, PS Ortopedico)**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE E IMPERMEAB.	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
<b>Pronto Soccorso PRE-TRIAGE</b> PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Pre-Triage	Pazienti/Colleghi	X			X		1		
	Triage	Pazienti/Colleghi	X					1		
<b>Pronto Soccorso AREA NON COVID</b> PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Assistenza	Pazienti/Colleghi	X					1		
	Esecuzione tampone e/o manovre che generano aerosol e/o contatto stretto <sup>3</sup> con paz che non indossa mascherina	Pazienti/Colleghi		X	X		X	2	X	X
	Pulizie	Area NON COVID	X					1		
	Trasporti interni	Area NON COVID	X					1		
	Modulistica, servizi vari	Area NON COVID	X					1		
	Assistenza	Pazienti/Colleghi	X	X*/***	X		X	2	X	X
<b>Pronto Soccorso AREA COVID</b> PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Esecuzione tampone	Pazienti/Colleghi		X	X		X	2	X	X
	Pulizie	Area COVID	X	X*	X		X	2	X	X
	Trasporti interni	Area COVID	X	X**	X		X	2	X	X
	Modulistica, servizi vari	Attività ordinaria	X					2		
	Il personale non accede all'AREA COVID, ma recupera quanto da trasportare nell'area FILTRO.									
*Utilizzare FFP3/2 per quelle procedure che generano aerosol o in setting assistenziali fortemente a rischio			<b>NB1:</b> A tutti i pazienti che accedono in PS con mascherina FFP1/2/3 con valvola di espirazione, va rimossa o coperta con mascherina tipo chirurgica; se indossano mascherina chirurgica questa può essere lasciata. <b>NB2:</b> Fornire kit per consulenti che accedono nelle varie aree COVID <b>NB3:</b> Eventuali accompagnatori/visitatori autorizzati devono indossare mascherina tipo chirurgica							
**Utilizzare FFP2/3 per il trasporto dei pazienti che effettuano ossigenoterapia.										
*** CPAP va eseguito esclusivamente in sala a pressione negativa										

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRE del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.

<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standard normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.

AREA DEGENZA - AREA CRITICA – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI <sup>☆</sup>										
STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
AREA DEGENZA/ AREA CRITICA/ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NON COVID  PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Assistenza	Pazienti/Collegli	X					1		
	Eventuale esecuzione tampone e/omanovre che generano aerosol e/o contatto stretto <sup>3</sup> con paz che non indossa mascherina	Pazienti/Collegli		X	X		X	2	X	X
	Pulizie	Area NON COVID	X					1		
	Trasporti interni	Area NON COVID	X					1		
	Modulistica, servizi vari	Area NON COVID	X					1		
AREA DEGENZA/ AREA CRITICA/ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI COVID  PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Assistenza	Pazienti/Collegli	X	X*/***	X		X	2	X	X
	Esecuzione tampone	Pazienti/Collegli		X	X		X	2	X	X
	Pulizie	Area COVID	X	X*	X		X	2	X	X
	Trasporti interni	Area COVID	X	X**	X		X	2	X	X
	Modulistica, servizi vari	Attività ordinaria	X					2		
Il personale non accede all'AREA COVID, ma recupera quanto da trasportare nell'area FILTRO.										

\*Utilizzare FFP3/2 per quelle procedure che generano aerosol o in setting assistenziali fortemente a rischio. \*\*utilizzare FFP2 per il trasporto dei pazienti che effettuano ossigeno terapia.  
\*\*\* CPAP va eseguito esclusivamente in sala a pressione negativa  
**NB1:** Fornire kit per consulenti che accedono nelle varie aree COVID  
**NB2:** Eventuali accompagnatori/visitatori autorizzati devono indossare mascherina tipo chirurgica . <sup>☆</sup> Comprende le strutture di Radiodiagnostica 1,2,3, Neuroradiologia e Medicina Nucleare

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRES del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.  
<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standards normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.

SALE OPERATORIE - AREE INTERVENTISTICHE – AREE ENDOSCOPICHE (emodinamica, aritmologia, angiografia - comprese procedure interventistiche neuroradiologiche e procedure endoscopiche del tratto respiratorio e del tratto digerente)											
STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA	
<b>SALA OPERATORIA</b> AREE INTERVENTISTICHE  <b>PAZIENTE NON COVID</b> (CON TAMPONE NEGATIVO)  <b>PAZIENTI: MASCHERINA<sup>2</sup></b>	Ingresso e presa in carico	Pazienti/Collegli	X					1	calzature dedicate	X	
	come da ordinario svolgimento della propria mansione										
	Assistenza anestesiologicala	Pazienti/Collegli		X	X			1	calzature dedicate	X	
	Assistenza chirurgo/ endoscopista	Pazienti/Collegli	X	X***	X***			1	calzature dedicate	X	
	Pulizie	Area NON COVID	X					1	calzature dedicate	X	
	Trasporti interni	Area NON COVID	X					1			
Modulistica, servizi vari	Area NON COVID	X					1				
<b>SALA OPERATORIA</b> AREE INTERVENTISTICHE <b>PAZIENTE COVID</b> + <b>PAZIENTI IN PENDENZA ESITO TAMPONE</b> (COMPRESSE LE URGENZE) <b>PAZIENTI: MASCHERINA<sup>2</sup></b>	Ingresso e presa in carico	Pazienti/Collegli		X	X		X	2	X	X	
	Assistenza anestesiologicala	Pazienti/Collegli		X	X		X	2	X	X	
	Assistenza chirurgo/ endoscopista	Pazienti/Collegli	X	X***	X		X	2		X	
	Pulizie	Area COVID	X	X*	X		X	2	X	X	
	Trasporti interni	Area COVID	X	X**	X		X	2	X	X	
	Modulistica, servizi vari	Attività ordinaria	X					2			
Il personale non accede all'AREA COVID, ma recupera quanto da trasportare nell'area FILTRO.											

\*Utilizzare FFP3/2 per quelle procedure che generano aerosol o in setting assistenziali fortemente a rischio. \*\* Utilizzare FFP2 per il trasporto dei pazienti che effettuano ossigeno terapia.

\*\*\* In caso di interventi chirurgici in urgenza sulle vie aeree (orofaringe, rinofaringe, trachea, bronchi, polmone) o sul tratto digerente in presenza di una importante contaminazione del campo operatorio, neurochirurgici urgenti con apertura del cranio, cardiocirurgici con interessamento del polmone, politrauma, o interventi in emergenza in cui l'equipe chirurgica deve agire in simultanea alle procedure di intubazione, anche l'equipe chirurgica dovrà indossare FFP2/3. Lo stesso vale per le procedure endoscopiche del tratto respiratorio e del tratto digerente in urgenza.

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRES del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.

<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standard normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.

**BLOCCO PARTO**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
<b>BLOCCO PARTO PAZIENTE NON COVID (CON TAMPONE NEGATIVO)</b>  PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Ingresso e presa in carico	Pazienti/Colleghi	X					1	calzature dedicate	X
	Assistenza al parto	Pazienti/Colleghi		X	X		X	1	calzature dedicate	X
	Pulizie	Area NON COVID	X					1	calzature dedicate	X
	Trasporti interni	Area NON COVID	X					1		
	Modulistica, servizi vari	Area NON COVID	X					1		
<b>BLOCCO PARTO PAZIENTE COVID + PAZIENTI IN PENDENZA ESITO TAMPONE (COMPRESSE LE URGENZE)</b>  PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Ingresso e presa in carico	Pazienti/Colleghi		X	X		X	2	X	X
	Assistenza al parto	Pazienti/Colleghi		X	X		X	2	X	X
	Pulizie	Area COVID	X	X*	X		X	2	X	X
	Trasporti interni	Area COVID	X	X**	X		X	2	X	X
	Modulistica, servizi vari	Attività ordinaria	X					2		
Il personale non accede all'AREA COVID, ma recupera quanto da trasportare nell'area FILTRO.										

\*Utilizzare FFP3/2 per quelle procedure che generano aerosol o in setting assistenziali fortemente a rischio.

\*\* Utilizzare FFP2 per il trasporto dei pazienti che effettuano ossigeno terapia.

**NB:** Eventuali accompagnatori/visitatori autorizzati devono indossare mascherina chirurgica

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRE del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.

<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standard normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.

**CHECK POINT/ ACCETTAZIONE UTENTI**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
INGRESSI E LOCALI ACCETTAZIONE UTENTI/PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Check point	Utenti/Collegli/ Pazienti	X		X			1		
	Attività amministrative	Utenti/Collegli/ Pazienti	X							
	Pulizie	Area NON COVID	X					1		

**AREA AMBULATORIALE/CENTRO PRELIEVI**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
AREA AMBULATORIALE/ CENTRO PRELIEVI PAZIENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Assistenza	Pazienti/Collegli	X					1		
	Assistenza	Pazienti con sintomi respiratori o procedure che generano aerosol		X	X		X*	1		
	Esecuzione tampone e/o contatto stretto <sup>3</sup> con paz che non indossa mascherina	Pazienti/Collegli		X	X		X	2	X	X
	Pulizie	Area NON COVID	X					1		
	Trasporti interni	Area NON COVID	X	X**	X**		X**	1		
	Modulistica, servizi vari	Area NON COVID	X					1		

\*Utilizzare FFP3/2 per quelle procedure che generano aerosol o in setting assistenziali fortemente a rischio.

\*\* da utilizzare per il trasporto dei pazienti che effettuano ossigeno terapia.

**NB:** Eventuali accompagnatori/visitatori autorizzati devono indossare mascherina chirurgica

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRE del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.

<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standard normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.

**LABORATORI**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
LABORATORI	Attività laboratoristiche	Campioni Biologici	Il personale di laboratorio lavora con procedure conformi al livello di biosicurezza stabilito dal DVR e con DPI conseguenti.							
	Pulizie	Area NON COVID	X					1		

**AREE AMMINISTRATIVE - UFFICI**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/ FFP3	PROTEZIONE OCULARE/ FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
UFFICI	Attività amministrative	Utenti/Collegli	X							
UTENTI: MASCHERINA <sup>2</sup>	Pulizie	Area NON COVID	X					1		

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRE del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.

<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standards normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.

**GESTIONE SALME**

STRUTTURA	PERSONALE ADDETTO A	A CONTATTO CON	MASCHERINA CHIRURGICA <sup>2</sup>	MASCHERINA FFP2/FFP3	PROTEZIONE OCULARE/FACIALE	SOVRACAMICE SEMPLICE	SOVRACAMICE IMPERMEABILE	GUANTI (PAIO)	SOVRA-SCARPE	CUFFIA
<b>DECESSO AVVENUTO IN AREA NON COVID</b>	Assistenza da parte della struttura	Salma/Colleghi	X			X		1		
	Assistenza da parte del personale Obitorio	Salma/Colleghi	X			X		1		
	Pulizie	Area NON COVID	X					1		
	Trasporto cadavere da parte del personale dell'obitorio	Cadavere/Colleghi	X**			X		1		
<b>DECESSO AVVENUTO IN AREA COVID</b>	Assistenza da parte della struttura	Salma/Colleghi	X				X	2	X	X
	Assistenza da parte del personale Obitorio	Salma/Colleghi	X				X	2	X	X
	Pulizie	Area COVID	X***				X	2	X	X
	Trasporto cadavere da parte del personale dell'obitorio	Cadavere/Colleghi	X**			X		1	X	X
<b>MANOVRE INVASIVE SU CADAVERE COVID O SOSPETTO (riscontro diagn./autopsia giudiz.)</b>	Esecuzione tampone faringo-nasale	Cadavere/Colleghi	X		X	X		2	X	X
	Accertamento necroscopico			X*	X		X	2 con interposto antitaglio	X	X

\*Utilizzare FFP3/2 per quelle procedure che generano aerosol o in setting assistenziali fortemente a rischio

\*\* Mascherina da indossare soltanto durante le operazioni di carico/scarico del cadavere

\*\*\* Previa areazione della stanza per almeno 30 minuti dall'uscita del cadavere

<sup>1</sup> Redatta in coerenza con: **PA 47** Misure di gestione dei pazienti per la prevenzione della trasmissione di microrganismi; Circolare Ministeriale n. 7922 del 09 03 2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso; OCDPC n. 648 del 9 03 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio; Rapporto ISS "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 10 05 2020; DGPRE del Ministero della Salute n. 9220 del 17 03 2020 che recepisce il documento ISS e Ordinanze RT n° 17, 26 e 35 del 2020.

<sup>2</sup> La tipologia di assegnazione avviene in base agli standards normativi e alle disponibilità effettive. Se il paziente non può indossarla o non la tollera, l'operatore deve indossare mascherina FFP2.

<sup>3</sup> Contatto stretto: permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri.

<sup>Δ</sup> Restano comunque valide le indicazioni al lavoratore sui DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggior rischio come da DVR aziendale e suo Addendum DVR SARS CoV2 Rev.00 del 21 04 2020.

Documento elaborato e condiviso da: Prof. A. Cristaudo, Prof. G. Privitera, Prof. A. Baggiani, Dott. G. Ceccanti, Dott. F. Escati, Dott. A. Tulipani, Dott.ssa G. Gemignani con il supporto di Dott.ssa M.C. Martino, dott.ssa F. Marchetti, Dott.ssa C. Toni e Dott.ssa C. Bisordi.